


Rod: *Phasianus* Linnaeus, 1758 — Fazani

Pradomovina fazana je srednja Azija. Kod vrsta iz ovog roda većinom je jasno izražen polni dimorfizam. Mužjak je obično krupniji od ženke i ukrašen je perjem koje se preliva u metalnim bojama.



Osnovne vrste fazana u svetu (najzastupljenije): 1. *Mongolicus*, 2. *Colchicus*, 3. *Torquatus*, 4 – 5. *Tenobrosus*, 6. *Versicolor*



Običan ili pravi fazan — *Phasianus colchicus colchicus* *Linnaeus, 1758*


- Vrsta *Phasianus colchicus* je veoma rasprostranjena, a u Srbiji se brojnost kreće između 190.000 - 230.000 parova, od kojih je polovina u Vojvodini.
- Areal mu se prostire od Tajvana i japanskih ostrva preko Kine i azijskog dela Rusije, kaspijskog priobalja i kavkavskog gorja do obala Crnog mora, odnosno od Tibeta i severnog Avganistana na jugu do Koreje, južne Mandžurije, Amura i srednje Mongolije.
- Najradije živi na poljoprivrednim zemljištima pored reka, u ravnicama i nižim brdovitim krajevima, jer su mu poljoprivredne kulture najomiljenije mesto za život.



- Prosečna težina mužjaka je oko 1.150 g. Dužina sa repom mu je oko 800 mm, od čega samo na rep otpada 420 mm. Raspon jednog krila mu je 250 mm.
- Leđa ženke su peščanomrka, a krila mrka sa nepravilnim poprečnim prugama. Na vratu i prednjem delu leđa perje je boje crvenog vina sa ljubičastim nijansama, koje nekada prelaze i na bokove. Grudi i trbuhi su svetlomrki sa sitnim tamnomrkim mrljama. Prosečna težina ženke je 850 g.




- Spada u tipične svaštojede jer ne bira hranu. U proseku voli lako svarljivu, energijom bogatu hranu. Mladi fazančići do četiri meseca starosti prevashodno se hrane insektima.
- U rano jutro uzimaju hranu, posle toga naročito u suvim predelima traži vodu, a ostatak dela dana provodi u hladovini. Uveče opet traži hranu.



Običan (pravi) fazan – mužjak i ženka



Rasprostranjenost



Stanište





- Za vreme parenja (april-maj) petlovi brane svoju teritoriju od uljeza (drugih petlova) i osnivaju hareme. U prirodi bude u haremu 4-6 koka i jedan petao. Za vreme udvaranja petlovi mlataraju krilima i oglašavaju se.
- Ženka pravi gnezdo na zemlji u koje snese 10-16 jaja na kojima leži 24 dana. Ako nastrada prvo gnezdo, ženka pravi drugo u koje snese 5-9 jaja, a ponekad se desi da pravi i treće gnezdo (kad joj strada drugo) u koje snese od 3-6 jaja.
- Ispiljeni mladi se prvih mesec dana hrane 90-95% životinjskom hranom



Razmnožavanje



Uzgoj fazana





Borba mužjaka





Predatori



Lov fazana



Mongolski fazan (mongolski pravi grivnaš) — *Phasianus colchicus mongolicus*
Brandt, 1845

Fazan ogrličar (kineski pravi grivnaš) — *Phasianus colchicus torquatus*
Gmelin, 1789

Običan šareni fazan (blještavi pravi fazan) — *Phasianus colchicus colchicus versicolor*
Vieillot, 1817

Zeleni pravi fazan (crni fazan) — *Phasianus colchicus colchicus var. tenebrosus* Sh.

Lovni fazan — *Phasianus spp.*

Današnji fazani Evrope su nastali ukrštanjem običnog fazana s rasama fazana grivnaša i mongolskog fazana, koji su kasnije donešeni.

Brojniji su melezi sa grivnom (vrlo retko se sreću fazani bez grivne) koji po nekim svojim odlikama podsećaju na grivnaša i mongolskog fazana, ali s nekim novim obeležjima kojih nema ni jedna izvorna rasa.

Ovaj melez, koga nazivamo lovnim fazanom, nije najbrojniji samo u lovištima, već i u odgajalištima. Nema odgajališta u Evropi koje gaji fazane čiste rase.



Zeleni fazan
– mužjak i
ženka





Šareni fazan
– mužjak i
ženka

Fazan ogrličar – mužjak i ženka



Mongolski fazan – mužjak i ženka

