


Rod: *Otis* Linnaeus, 1758 — Droplje

Mužjak i ženka po spoljašnjem izgledu se razlikuju. Nemaju visećeg perja oko vrata.



Velika droplja - *Otis tarda* Linnaeus, 1758

Rasprostranjenost velike droplje



- Velika droplja ili, kako je još zovu, potrk, najveća je naša ptica. Najviše ih ima u prostranim poljima Rumunije, Rusije, Španije, Mađarske, Ukrajine, Nemačke, Moldavije, gde se nalazi većina evropske populacije.
- Kod nas se nalazi u ravnicama Vojvodine. Trenutno postoji mikropopulacija ove ptice u severnom Banatu.
- Droplja je vrlo plaha i oprezna ptica. Pred opasnošću vrlo dobro trči. Kad uzleti, opet se brzo spušta na zemlju, ali dok je u vazduhu leti dosta sigurno.



- Pari se u aprilu-maju. U to vreme mužjak živi samo pored jedne ženke. U maju snese ženka u primitivnom gnezdu na zemlji, obično u žitu, 2-3 plavkastozelena jajeta sa smeđim prugama.
- Na jajima leži droplja stalno i posle 30 dana izlegu se mladi. Nekoliko dana mladi su vrlo nespretni i teško se kreću, a u mladosti podležu raznim bolestima.
- Droplje stradaju najviše zimi, kad padne ledena kiša, jer im se zalede krila.
- Leti se hrani insektima, miševima, žabama, semenjem raznovrsnih trava, repicom i detelinom, pase travu, a veoma voli repu i kupus. Zimi najviše pase lišće uljane repice i mlado žito.







