

Rod: *Corvus* Linnaeus, 1758 — Vrane

U Evropi živi 5 vrsta:

1. Gavran – *Corvus corax* Linnaeus, 1758
2. Gačac – *Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758
3. Vrana - *Corvus corone corone* Linnaeus, 1758
4. Siva vrana – *Corvus corone cornix* Linnaeus, 1758
5. Čavka – *Corvus monedula* Linnaeus, 1758

1.



2.



3.



4.



5.



Gavran - *Corvus corax* Linnaeus, 1758

- obitava u celoj Srbiji, a posebno na višim terenima
- gnezda prave na najvišim stablima u šumi, a u novije vreme i na stubovima dalekovoda
- par gavrana ostaje veran jedno drugom celi život
- svejed je i jede sve od sitnih glodara, pomlatka divljači, tek posejanih ratarskih kultura, do otpada u blizini ljudskih naselja
- teritorijalne su ptice, legu 3-7 plavkasto-zelenih jaja sa smeđim pegama, oba roditelja sede na jajima i hrane mlade



Gačac – *Corvus frugilegus Linnaeus, 1758*

- gnezdi se u kolonijama na krošnjama drveća
- snese 3-5 jaja na kojima sedi 16 -18 dana, a mladi prolete nakon mesec dana
- perje starih ptica je jednolično modro crno, dok je u mlađih ptica mutno crno
- hrani se larvama hrušteva, miševima, puževima, mladuncima divljači, otpacima koje nađe u naseljima, a u proleće pravi štete na tek posejanim ratarskim kulturama
- mlade ptice imaju lice obraslo perjem, dok u starosti imaju golo lice



Siva vrana – *Corvus corone cornix* Linnaeus, 1758

- obitava i gnezdi na području cele Srbije
- gnezdo pravi na osamljenim visokim stablima u polju, u proleće ženka nosi 4-6 jaja, na kojima ženka sedi 17-19 dana, a mladi prolete nakon mesec dana
- hrani se glodarima, malim pticama, njihovim jajima i mladuncima, te zrnevljem žitarica
- u proleće vadi zrnevlje ratarskih kultura
- poznate su kao strvinari te se često viđaju u blizini gradskih smetlišta



Čavka – *Corvus monedula* Linnaeus, 1758

- obitava na području cele Srbije, a posebno u Vojvodini
- gnezdi uglavnom u starim napuštenim zgradama, tornjevima i zvonicima. Ženka snese 4-6 zelenih mrkopegavih jaja, na kojima leži 17-18 dana. Mladi napuste gnezdo sa 5 nedelja.
- glavna hrana su joj raznovrsni insekti, puževi i crvi, te otpaci s ljudske trpeze
- u proleće pravi štete na tek posejanim ratarskim kulturama i pomlatku divljači
- slaže se s drugim pticama, a redovno je pratilac sive vrane

