

Rod: *Streptopelia* Bonaparte, 1855 — Grlice

U okviru ovog roda u Evropi žive dve vrste i to: grlica (*Streptopelia turtur* Linnaeus, 1758) i gugutka ili kumrija (*Streptopelia decaocto* Frivaldszky, 1838).



Streptopelia turtur Linnaeus, 1758



Streptopelia decaocto Frivaldszky, 1838

Grlica — *Streptopelia turtur* Linnaeus, 1758



- Grlica se pored naših krajeva gnezdi u celoj Evropi do visine Severnog mora, u severnoj Africi i jugozapadnim delovima Azije oko Aralskog jezera i severnog Irana. Evropska populacija zimuje u Africi, južno od Sahare.
- Životni prostor su joj mešovite šume, parkovi sa grmljem, vrtovi, polja, ali zato izbegava naselja.
- Grlica je kod nas svuda poznata ptica selica. U našim krajevima grlica se pojavljuje u preletu, a stiže u martu i aprilu. Znatan broj ptica se zadržava radi reprodukcije dok ostale produžavaju dalje.
- Grlica je ponovo u preletu kod nas u avgustu i septembru, i tada je veoma brojna. Zadržava se na poljoprivrednom zemljištu, naročito na suncokretu, hraneći se intenzivno i pripremajući se za daljnju seobu u pravcu juga.



- Poraste u dužinu oko 30 cm. Osnovna boja perja je plavkastosiva. Mužjak je po vratu belocrnkasto prugast. Ledja su crvenkastomrka sa crnim tačkama, a perje na vratu i grudima ružičasto se preliva. Na vratu, sa obe strane, postoji bela mrlja sa crnim trakama.
- Hrani se semenkama, bobicama, puževima i crvićima.
- Gnezdi se u celoj našoj zemljii u većem delu Evrope. Gnezdo pravi na drveću i grmlju po šumama, poljima i oranicama i to dva puta u godini, u maju i junu. Snese dva bela i sjajna jajeta, na kojima leži 14-16 dana. Meso joj je kvalitetno. O mladima brinu oba roditelja.



Rasprostranjenost grlice





Razmnožavanje







Gugutka — *Streptopelia decaocto* Frivaldszky, 1838

- Pored Evrope, gugutka se gnezdi i u južnoj Aziji, od Male Azije preko Irske, Irana, Indije, centralne Kine, sve do Kineskog mora.
- Stanarica je. Životni prostor su joj otvoreni, suvi krajevi sa drvećem i grmljem a takođe i parkovi i vrtovi blizu naselja. Posebno voli da se gnezdi u naseljenim mestima.
- Gugutka (kumrija) je nešto veća od grlice sa kojom je po boji perja vrlo slična. Na gornjem delu vrata ima crnu ogrlicu. Leđa su joj žutomrka, a rep je sa gornje strane beo, a sa donje strane bela pera dosežu do polovine repa.



- Hrani se istom hranom kao i grlica.
- Gnezdi se više puta u godini. Ženka počev od februara u primitivnom gnezdu, napravljenom od malog broja grančica, snese 2 bela sjajna jaja.
- Na kojima naizmenično leže i mužjak i ženka 15-17 dana.



Rasprostranjenost gugutke

