

Rod: *Perdix* Brisson, 1760 — Jarebice
U Evropi živi samo jedna vrsta.



Jarebica - *Perdix perdix* Linnaeus, 1758

- Poljska jarebica, trčka, skvržulja spada u poljske koke.
- Rasprostranjena je kao autohtona vrsta po celoj našoj zemlji i u većem delu Evrope.
- Areal joj se kreće od srednje Švedske, do Mediterana, od zapadnih obala Španije do duboko u azijski kontinent.
- Procenjena brojnost u lovištima Srbije je od 25.000 do 45.000 parova, dok se vojvođanska populacija kreće od 10.000 do 15.000 parova (Puzović, 2011).



Polni dimorfizam- mužjak levo, ženka desno

- Mužjak ima na prsima šaru u obliku potkovice koja je tamnokestenjaste boje. Ovakvu potkovicu imaju i starije koke, ali ona nije toliko izražena kao kod petla. Ovu potkovicu imaju i mlade koke ali je kod njih još manje izražena nego kod starih koka.
- Najlakši znak raspoznavanja petla od koke je pokrovno perje na krilima. Kod petla svako pero ima samo jednu uzdužnu belu prugu koja se prostire sredinom pera dok koka ima sem uzdužne i poprečne bele pruge.



- Jarebica je dužine tela od 39-49 cm, od čega na rep otpada 7 cm, a raskriljena meri do 50 cm.
- Težina joj se kreće od 370-420 g (mužjaci od 290-460 g a ženke od 280-420 g).
- Kod jarebica se dosta često pojavljuje delimični albinizam tako što su pojedini delovi tela beli (krila i rep).
- Hrani se raznim insektima, ličinkama, paucima, leptirima, muvama, skakavcima, repnim pipama i dr. životinjicama koje jede do septembra a nakon toga glavna hrana joj je seme korovskih biljaka i ispalo seme kulturnih biljaka. Prema tome, jarebica je veoma korisna koka za poljoprivredu i nikad ne pravi štete.




- Jarebica je monogamna, što znači da petao živi samo sa jednom kokom za vreme parenja i odgajanja mladih.
- Za vreme parenja dolazi često do ogorčenih borbi između mužjaka da bi sebi osvojili ženku.
- U aprilu-maju ženka snese u udubljenju na zemlji 8—16 svetlozelenih (maslinastozelenih) jaja na kojima leži 24 dana. Prosečna težina jaja je 13 g.
- Kada se mali ispile, težina im je oko 9 grama, a za 14 dana težina se uveća za više od 5 puta.
- Prvih mesec dana mladi se hrane 95-98% animalnom hranom, a nakon ovog perioda prelaze i na biljnu hranu. Od aprila do avgusta učešće hrane životinjskog porekla iznosi od 63% dok je u jesen ovo učešće oko 5%.

Starost mladih jarebica, dana	Biljna u %	Animalna u %
1-7	4,7	95,3
8-14	9,3	90,7
15-21	47,5	52,5
Posle 21	96,7	3,3

Menjanje strukture
obroka jarebica u
zavisnosti od starosti

Rasprostranjenost









Razmnožavanje



- Neprijatelji jarebice su: svrake, sive vrane, lisice, lasice, tvorovi, psi i mačke lutalice, jastrebovi, kopci i drugi pernati i dlakavi predatori. Najveći neprijatelj jarebice je oštra i jaka zima, kada ne može da dođe do hrane.

