


Rod: *Scolopax* Linnaeus, 1758 — Šumske šljuke

Telo im je zbijeno, trče na kratka odstojanja, a u Evropi živi jedna vrsta.



Scolopax rusticola Linnaeus, 1758

Rasprostranjenost šumske šljuke



- Ptica selica. Leto provodi u niskim šumovitim i močvarnim krajevima severne Evrope i Azije, a zimu u zemljama oko Sredozemnog mora, u Italiji, Grčkoj, severnoj Africi i na ostrvima u Jadranskom, Jonskom i Sredozemnom moru.
- Glava joj je izdužena u visoko čelo. Krupne i crne oči smeštene su u glavi i malo ustranu povučene. Kljun joj je ravan, vitak, mekan i 7 - 8 cm dug, na kraju tupo zaobljen i pokriven kožom, pun nerava, što joj omogućava da oseti pokret svakog crva kad kljun zavuče u zemlju.
- Ženka je veća i teža od mužjaka, ali ne može da se po spoljnim znacima razlikuje.



- Šljuke se pare rano u proleće, a u planinama i do jula, već za vreme samog preletanja preko lovišta.
- U aprilu kada su šljuke sparene, ženka snese u primitivnom gnezdu na zemlji 3-5 a najčešće 4 žućkastopegava jajeta. Ženka leži na gnezdu, i posle tri nedelje (21-23 dana) izlegu se žućkasti pilići išarani smeđim prugama.



- Kako šljuka ni noću ne uzleće na drvo, mnogo strada od lisica, kuna, tvorova, lasica, jazavaca, mačaka i ptica grabljivica.
- Hrani se glistama, puževima i insektima koje kljunom vadi iz vlažne šumske zemlje, a jede i sitno korenje i čupka travu.



00493247 © Jean-Luc & Françoise Ziegler/ Biosphoto / Minden Pictures



