

Rod: *Coturnix* Garsault, 1764 — Prepelice

U Evropi živi jedna vrsta iz ovog roda.



Prepelica - *Coturnix coturnix* Linnaeus, 1758

- Prepelica je ptica selica i najmanja koka u našim poljskim lovištima.
- Sa obala Severne Afrike dolazi u naša polja krajem aprila ili početkom maja i ovde se gnezdi.
- Krajem avgusta, kad odrastu mladi, skupljaju se opet u jata i preko Italije i Sicilije, lete preko mora u pravcu Afrike, gde provode zimu.
- Ipak, redovno manji broj primeraka ostaje u našim krajevima i tokom zimskih meseci.



- Rasprostranjena je gotovo u celoj Evropi, osim na Islandu, Skandinaviji, severu Finske i severu Rusije.
- Životni prostor su joj ravnice sa livadama, široka polja, ugari, deteliništa i strnjišta, ali i planinski pašnjaci između 1.000—1.800 m n.v.
- Zemlja sa ubedljivo najvećom brojnošću prepelica je Španija (oko 370.000 parova) i donekle Francuska (oko 100.000 parova).
- U Srbiji stanje populacija ove vrste nije dovoljno istraženo, ali postoje procene da je ima oko 20.000 — 40.000 parova (za period od 2001. do 2010), koji su ravnomerno raspoređeni i u Vojvodini i u brdsko-planinskim krajevima Srbije.




- Prepelica poraste u dužinu do 20 cm, a raskriljena je široka oko 35 cm.
- Rep joj je dugačak oko 3 cm, a crvenkastožućkaste noge visoke su joj 2,5 cm.
- Telesnu masu dostiže od 95 do 150 g. Osnovna boja perja je rđastosiva i crno isprskana.
- Hrani se u polju zrnevljem raznih žitarica i korova, semenjem maka i konoplje, hvata insekte i jede mravlje lutke.
- Prepelice mnogo uništavaju lisice, lasice, tvorovi, kune, mačke i sve ptice grabljivice. Smatra se da su glavni razlozi opadanja brojnosti u Evropi: preoravanje pašnjaka, livada i strnjišta, korišćenje štetnih pesticida i neumeren lov pomoću vabilica.



- Gnezda pravi vrlo jednostavno, u travi, žitu i grmlju i u junu snese 8-16 žućkasto-smeđih jaja, koja su isprskana tamnim pegama, prosečne mase 8-9 g. Sezona parenja traje tokom maja. Mužjaci ne trpe druge mužjake u prisutstvu ženke prilikom parenja.
- Ženka prepelice u gnezdo napravljeno od trave polaže od 6 do 18 belih ili prljavožutih jaja sa crnim pegama, te na njima leži od 16 do 18 dana. Gnezdo se nalazi ispod grmlja, zaštićeno je od grabljivaca.
- Mladi su uz majku oko tri sedmice, nakon čega postaju samostalni i znaju leteti. Prepelice su brižljive prema svojim mladima, a nekad prihvate i tuđe piliće koji su ostali bez majke. Ako prvo leglo bilo iz kojih razloga propadne, prepelica ponovo nosi jaja.



Rasprostranjenost



breeding

feeding, wintering

resident

Colurnix coturnix

digitised by GROMS, after
del Hoyo et al.1991-1999,
www.hbw.com

Copyright: GROMS/BfN - www.groms.de





Razmnožavanje



Lov na prepelice

