

**Rod: *Columba* Linnaeus, 1758 — Golubovi**

U Evropi žive četiri vrste (golub grivnaš, golub dupljaš, divlji golub, golub-pećinar i domaći golub).

1. Golub grivnaš – *Columba palumbus* Linnaeus, 1758
2. Golub dupljaš – *Columba oenas* Linnaeus, 1758
3. Divlji golub – *Columba livia livia* Gmelin, 1789
4. Domaći golub - *Columba livia domestica*, Gmelin, 1789



1.



2.



3.



4.



## Golub grivnaš — *Columba palumbus* Linnaeus, 1758

- Golub grivnaš je uglavnom stanarica i najveći golub, koji se zadržava u Srbiji tokom cele godine.
- Živi praktično u celoj Evropi. U zapadnoj i severnoj Evropi je posle divlje patke i šumske šljuke jedna od najvažnijih pernatih lovni divljači u savremeno doba, sa godišnjim odstrelom od više miliona jedinki.





- Gnezdo pravi na visokim stablima u šumi, a u aprilu i junu snese ženka 2 sjajna bela jajeta, na kojima leži 16-17 dana. U toku godine gnezdi se 2-3 puta.
- Na gnezdu pri leženju naizmenično se smenjuju mužjak i ženka. O mladima brinu oba roditelja (mesec dana).






- Životni prostor su mu šume, parkovi, vrtovi, polja, šumarci a zadržava se i u naseljima. Zimu provede u Severnoj Africi i na ostrvima u Sredozemnom moru.
- Hrani se semenom raznih trava, korova i žita, jede gliste i puževe, a u nuždi i semenje četinara, žir, bukvicu i borovnicu.






## Rasprostranjenost goluba grivnaša







## Razmnožavanje













## Golub dupljaš — *Columba oenas* Linnaeus, 1758

- U našim krajevima (zavisno od položaja) dupljaš može biti stanarica, selica ili se, pak, pojavljuje u preletu, pa čak i kao zimski gost. U Srbiji ima od 250 do 500 parova, a u Vojvodini do 100.
- Vrlo je sličan domaćem golubu.
- Naseljava celu Evropu, sem krajnjeg severa.
- Dupljaš je manji i tamniji od grivnaša, a takođe i brže leti od njega. Poraste oko 33 cm u dužinu.
- Životni prostor su mu šume, parkovi, vrtovi, a zadržava se i na rubovima naselja.





- Hrani se uglavnom semenjem, bobicama, biljnim izdancima, puževima i drugim sitnim životinjicama.
- Gnezdi se u šupljim stablima-dupljama po stepama i ruševinama, po čemu je i dobio ime.
- U aprilu i junu, a ponekad i u avgustu, snese ženka dva bela sjajna jajeta i to svaki put na drugom mestu. Na jajima leži 16-17 dana. O mladima se brinu oba roditelja.





## Divlji golub (pećinar) — *Columba livia livia* Gmelin, 1789

- Divlji golub (pećinar) rasprostranjen je u Portugaliji, Španiji, na jugu Francuske, Italiji, Korzici, Sardiniji, Grčkoj, Bugarskoj, na obalama Irske i Škotske.
- Životni prostor su mu stenoviti krajevi na granici travnih ravnica. Golub divlji nalazi se kod nas, samo po krševitim brdsko-planinskim oblastima, posebno u klisurama i kanjonima.
- Perje mu je modrosive boje, a na pokrildu i na kraju leđa belo. Preko krila ima dve široke crne pruge, što je i glavno obeležje po čemu će se ova vrsta goluba lako raspoznati u letu.





- Od divljeg goluba vode poreklo sve vrste domaćih golubova.
- Hrani se prevashodno semenjem, a jede i puževe i biljnu hranu.
- Gnezdi se u južnoj Evropi i kod nas po ruševinama, pećinama i starim zvonarama, a živi u velikom društvu.
- U aprilu i junu snese ženka dva jajeta, na kojima leži 17 dana, naizmenično mužjak i ženka. U toku godine gnezdi se 2-3 puta.





Pored tri napred opisane vrste u okviru ovog roda postoji i četvrta vrsta a to je **domaći golub** — *Columba livia domestica* Gmelin, 1789.

Rasprostranjen je u celoj Evropi.

Životni prostor su mu vrtovi, parkovi, polja a voli da živi i na salašima.

Gnezdi se ispod streha pod krovovima, a gnezdo pravi od trave ili sitnih grančica u koje ženka u aprilu snese 2 bela sjajna jaja na kojima naizmenično leže i mužjak i ženka 17 dana. O mladima se staraju oba roditelja.

